

## 葛根湯

### 効能又は効果

感冒,鼻かぜ,頭痛,肩こり,筋肉痛,手や肩の痛み

### 用法及び用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mlを加えて、半量くらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。

14才～7才は大人の2 / 3

6才～4才は大人の1 / 2

3才～2才は大人の1 / 3

2才未満は 大人の1 / 4

3ヵ月未満は服用しないこと

3包入

(製造販売元)

成分(1日量)

日本薬局方	カッコン	8.0	g
日本薬局方	マオウ	4.0	g
日本薬局方	ショウキョウ	1.0	g
日本薬局方	タイソウ	4.0	g
日本薬局方	ケイヒ	3.0	g
日本薬局方	シャクヤク	3.0	g
日本薬局方	カンゾウ	2.0	g
	全 量	25.0	g

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 次の人は服用しないでください。

生後3か月未満の乳児

(2) 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。

(3) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

(4) 小児の手の届かない所に保管してください。

製造番号

使用期限

## 葛根湯

葛根湯は、「傷寒論」・「金匱要略」に収録されている、感冒や肩こり、筋肉痛等に用いられる漢方薬です。

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください  
生後3カ月未満の乳児。

## 🗨 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1カ月位(感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる場合。

## 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

## 効能・効果

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## 成分と分量

1包(大人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	カッコン	マオウ	ショウキョウ	タイソウ	ケイヒ	ジャクヤク	カンゾウ
分 量	8.0g	4.0g	1.0g	4.0g	3.0g	3.0g	2.0g

## 用法・用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mLを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。  
上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	14才～7才	6才～4才	3才～2才	2才未満	3カ月未満
服用量	上記の通り	大人の2/3	大人の1/2	大人の1/3	大人の1/4以下	服用しないこと
1日服用回数	3回					

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、止むを得ない場合のほかは、服用させないでください。
- (4) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- (5) 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- (5) 生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。

## ■お問い合わせ先

製造・販売元

# 製 造 記 録

管理者	
-----	--

処方番号 K20	品名	<b>葛根湯</b>				Lot No.				
調整年月日	平成 年 月 日			天候		温度		湿度		
成 分		1日分量	分量	確認	原料メ-カ-		原料LotNo.			
日本薬局方 カッコソ		8.0g	g							
日本薬局方 マオウ		4.0g	g							
日本薬局方 ケイヒ		3.0g	g							
日本薬局方 シャクヤク		3.0g	g							
日本薬局方 タイソウ		4.0g	g							
日本薬局方 カンゾウ		2.0g	g							
日本薬局方 ショウキョウ		1.0g	g							
全 量		25.0g	g	合	調 整 者					
製 剤 出 来 高 分 量			g	否						
用 法・用 量		規 格		煎じ薬として1包25g、 1包/日						
大人 1日1包 を煎じ、 1日3回に分服		分包年月日	平成 年 月 日		分包者					
		包装年月日	平成 年 月 日		日分	包入	包装			
平成 年 月 日			日分	包入	包装					
平成 年 月 日			日分	包入	包装					
使用期限・その他特記事項										
製剤全量		g	- 分包全量		g	= 残量		g		
試    験	平成 年 月 日			試験者						
	確 認									
	定 性									
	重 量 偏 差									
	定 量							判定		

## 葛根湯の用量 (1日分)

---

カッコン	8.0	g
マオウ	4.0	g
ショウキョウ	1.0	g
タイソウ	4.0	g
ケイヒ	3.0	g
シャクヤク	3.0	g
カンゾウ	2.0	g
	25.0	g

---

3日分(3袋)製造します

(自薬局名) **成和薬局高水前店 葛根湯**

効能又は効果

感冒,鼻かぜ,頭痛,肩こり,筋肉痛,手や肩の痛み

用法及び用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mlを加えて、半量くらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。

14才～7才は大人の2 / 3

6才～4才は大人の1 / 2

3才～2才は大人の1 / 3

2才未満は 大人の1 / 4

3ヵ月未満は服用しないこと

3包入

(製造販売元)

**成和薬局高水前店**(自薬局名)

〒740-0032 山口県岩国市尾津町2-23-13

TEL(0827)21-3018 FAX(0827)23-9184

成分(1日量)

日本薬局方	カッコン	8.0	g
日本薬局方	マオウ	4.0	g
日本薬局方	ショウキョウ	1.0	g
日本薬局方	タイソウ	4.0	g
日本薬局方	ケイヒ	3.0	g
日本薬局方	シャクヤク	3.0	g
日本薬局方	カンゾウ	2.0	g
全 量		25.0	g

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 次の人は服用しないでください。  
生後3か月未満の乳児
- (2) 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
- (3) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- (4) 小児の手の届かない所に保管してください。

管理しやすい番号にしてください。(製造年月日など)

製造番号 90601

規制原料がないので、製造日から2年間にしてください。

使用期限 2011年6月1日

## 葛根湯

葛根湯は、「傷寒論」・「金匱要略」に収録されている、感冒や肩こり、筋肉痛等に用いられる漢方薬です。

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください  
生後3カ月未満の乳児。

## ■ 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1カ月位(感冒、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる場合。

## 3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

## 効能・効果

感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## 成分と分量

1包(大人1日量)中に次の成分を含んでいます。

成 分	カッコン	マオウ	ショウキョウ	タイソウ	ケイヒ	ジャクヤク	カンゾウ
分 量	8.0g	4.0g	1.0g	4.0g	3.0g	3.0g	2.0g

## 用法・用量

本品1包を和紙袋入りのまま、水約500mLを加えて、半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用してください。  
上記は大人の1日量です。

年 齢	大人(15才以上)	14才～7才	6才～4才	3才～2才	2才未満	3カ月未満
服用量	上記の通り	大人の2/3	大人の1/2	大人の1/3	大人の1/4以下	服用しないこと
1日服用回数			3回			

## ＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1才未満の乳児には、止むを得ない場合のほかに、服用させないでください。
- (4) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこしてください。
- (5) 本剤は必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないでください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用してください。
- (5) 生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。

## ■ お問い合わせ先

**成和薬局高水前店 管理薬剤師 國塚理恵**  
受付時間 9:00～18:00 (日曜・祝日を除く)  
TEL(0827)32-1147 FAX(0827)32-1125

製造・販売元

**成和薬局高水前店**

**山口県岩国市尾津町2-23-13**

# 製造記録

このあたりは書かなくても良いです

管理者	國塚 理恵
-----	-------

自薬局名+葛根湯

処方番号 K20	品名	成和薬局高水前店 葛根湯		Lot No.	090301 (管理しやすい番号で)					
調整年月日	平成 21 年 3 月 1 日			天候	晴れ	温度	15	湿度	40%	
成分		1日分量	分量	確認	原料メーカー		原料LotNo.			
日本薬局方 カッコン		8.0g	24.0g		ウチダ		001709002			
日本薬局方 マオウ		4.0g	12.0g		ウチダ		8BP0601			
日本薬局方 ケイヒ		3.0g	9.0g		ウチダ		93Q0129			
日本薬局方 シャクヤク		3.0g	9.0g		トチモト		005309007			
日本薬局方 タイソウ		4.0g	12.0g		ウチダ		9200302			
日本薬局方 カンソウ		2.0g	6.0g		ウチダ		8800114			
日本薬局方 ショウキョウ		1.0g	3.0g		トチモト		005809004			
					生薬の袋を参照					
全量		25.0g	75g	合	調整者					
製剤出来高分量			g	否	戸田康紀					
用法・用量		規格		煎じ薬として1包25g、1日1包						
大人 1日1包 を煎じ、 日3回に分服	1	分包年月日	平成 21 年 3 月 1 日	分包者	戸田康紀					
			平成 21 年 3 月 1 日	3日分 3包入 1 包装						
	使用期限・その他特記事項	包装年月日	平成 年 月 日	日分	包入	包装				
	2011.3 (製造後2年間で)		平成 年 月 日	日分	包入	包装				
製剤全量		75 g	-	分包全量	75 g	=	残量	0	g	
試験	平成 年 月 日			試験者						
	確認									
	定性									
	重量偏差									
	定量								判定	