

感冒剤12号 A

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法及び用量

1回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。
大人(15才以上) 1包 2.0g

- 11才以上15才未満は大人の2/3
- 7才以上11才未満は大人の1/2
- 3才以上7才未満は大人の1/3
- 1才以上3才未満は大人の1/4

15包入

(製造販売元)

成分(1日量)

日本薬局方	アセトアミノフェン	0.36g
日本薬局方	イブプロフェン	0.9g
日本薬局方	マレイン酸クロルフェニラミン	0.0075g
日本薬局方	dl-塩酸メチルエフェドリン散	0.6g
日本薬局方	リン酸ジヒドロコデイン100倍散	2.4g
賦形剤	デンプン、乳糖又はこれらの混合物	適量
	全量	6.0g

【注意】

次の人は服用しないでください。

- 1.本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
- 2.本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用して喘息を起こしたことがある人。
- 3.服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。
- 4.服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
- 5.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 6.小児の手の届かない所に保管してください。

製造番号

使用期限

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

感冒剤 12号A

感冒剤 12号Aは、かぜの諸症状を緩解するお薬で、アセトアミノフェン・エテンザミドは解熱・鎮痛効果を発揮し、メチルエフェドリン・マレイン酸クロルフェニラミン・リン酸ジヒドロコデインはそれぞれの働きで鼻水、鼻閉、せき、たん等の症状を緩和します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 次の人は服用しないでください
 - 本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
 （眠気があらわれることがあります。）
 - 服用時は飲酒しないでください
 - 長期連用しないでください

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
 高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
 - 糖尿病薬又は抗凝血薬で治療を受けている人。

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
ぜんそく	

- 2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

- 3) 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
 便秘、口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

成分と作用

6.0g（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	6.0g中	作 用
アセトアミノフェン	0.36g	熱を下げ、痛みを和らげます。
エテンザミド	0.9g	熱を下げ、痛みを和らげます。
マレイン酸 クロルフェニラミン	0.0075g	くしゃみ・鼻水・鼻づまり等のアレルギー症状をおさえます。
d,l-塩酸メチル エフェドリン散	0.6g	せきを和らげ、たんを切り取ります。
リン酸ジヒドロ コデイン100倍散	2.4g	せきを和らげ、たんを切り取ります。
デンプン、乳糖又は これらの混合物	適 量	賦形剤。

用法・用量

1回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包2.0g	3回
11才以上15才未満	大人の2/3	
7才以上11才未満	大人の1/2	
3才以上7才未満	大人の1/3	
1才以上3才未満	大人の1/4	
1才未満の乳児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 1包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。

■お問い合わせ先


製造・販売元

製 造 記 録

管理者	
-----	--

処方番号 かぜ薬4 -	品名	感冒剤12号A				Lot No.				
調 整 年 月 日	平成 21 年 3 月 10 日				天候		温度		湿度	
成 分	1日分量	分量	確認	原料メーカー			原料LotNo.			
日本薬局方 アセトアミノフィン	0.36g	g								
日本薬局方 イテンザミド	0.9g	g								
日本薬局方 マレイン酸クロルフェニラミン	0.0075g	g								
日本薬局方 dl-塩酸メチルエフェドリン散	0.6g	g								
日本薬局方 リン酸ジヒドロコデイン100倍散	2.4g	g								
賦形剤 日本薬局方 乳糖	1.7325g	g								
全 量		g	g	合	調 整 者					
製 剤 出 来 高 分 量			g	否						
用 法・用 量		規 格		1包	g、1日	包=	g			
大人 1回 1日	g 回	分包年月日	平成 年 月 日	分包者						
		使用期限・その他特記事項	包装年月日	平成 年 月 日	日分	包入	包装			
平成 年 月 日	日分			包入	包装					
平成 年 月 日	日分			包入	包装					
製剤全量		g	- 分包全量		g	= 残量		g		
試 験	平成 年 月 日			試験者						
	確 認									
	定 性									
	重 量 偏 差									
定 量								判定		

感冒剤12号A 5日分の製造手順



(自薬局名)成和薬局高水前店 感冒剤12号 A

効能又は効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法及び用量

1回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用する。
大人(15才以上) 1包 2.0g

- 11才以上15才未満は大人の2/3
- 7才以上11才未満は大人の1/2
- 3才以上7才未満は大人の1/3
- 1才以上3才未満は大人の1/4

15包入

(製造販売元)

成和薬局高水前店(自薬局名)

〒740-0032 山口県岩国市尾津町2-23-13
TEL(0827)21-3018 FAX(0827)23-9184

成分(1日量)

日本薬局方	アセトアミノフェン	0.36g
日本薬局方	イブプロフェン	0.9g
日本薬局方	マレイン酸クロルフェニラミン	0.0075g
日本薬局方	dl-塩酸メチルエフェドリン散	0.6g
日本薬局方	リン酸ジヒドロコデイン100倍散	2.4g
賦形剤	デンプン、乳糖又はこれらの混合物	適量
	全量	6.0g

【注意】

次の人は服用しないでください。

- 1.本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
- 2.本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用して喘息を起こしたことがある人。
- 3.服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。
- 4.服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
- 5.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 6.小児の手の届かない所に保管してください。

管理しやすい番号にしてください。(製造年月日など)
製造番号 90601
規制原料がないので、製造日から2年間にしてください。
使用期限 2011年6月1日

かぜ薬

この説明書は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

感冒剤 12号A

感冒剤 12号Aは、かぜの諸症状を緩解するお薬で、アセトアミノフェン・エテンザミドは解熱・鎮痛効果を発揮し、メチルエフェドリン・マレイン酸クロルフェニラミン・リン酸ジヒドロコデインはそれぞれの働きで鼻水、鼻閉、せき、たん等の症状を緩和します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
- 次の人は服用しないでください
 - 本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
 - 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気があらわれることがあります。）
 - 服用時は飲酒しないでください
 - 長期連用しないでください

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。

高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
 - 糖尿病薬又は抗凝血薬で治療を受けている人。

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
ぜんそく	

- 2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

- 3) 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

成分と作用

6.0g（大人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	6.0g中	作 用
アセトアミノフェン	0.36g	熱を下げ、痛みを和らげます。
エテンザミド	0.9g	熱を下げ、痛みを和らげます。
マレイン酸クロルフェニラミン	0.0075g	くしゃみ・鼻水・鼻づまり等のアレルギー症状をおさえます。
d,l-塩酸メチルエフェドリン散	0.6g	せきを和らげ、たんを切り取ります。
リン酸ジヒドロコデイン100倍散	2.4g	せきを和らげ、たんを切り取ります。
デンプン、乳糖又はこれらの混合物	適 量	賦形剤。

用法・用量

1回量を次のとおりとし、1日3回、食後服用します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包2.0g	3回
11才以上15才未満	大人の2/3	
7才以上11才未満	大人の1/2	
3才以上7才未満	大人の1/3	
1才以上3才未満	大人の1/4	
1才未満の乳児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 1包の分割した残りを服用する場合には、残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。

■お問い合わせ先

成和薬局高水前店 管理薬剤師 國塚理恵
 受付時間9:00～18:00(日曜・祝日を除く)
 TEL(0827)32-1147 FAX(0827)32-1125

製造・販売元

成和薬局高水前店 山口県岩国市尾津町2-23-13

製造記録

このあたりは書かなくても良いです

管理者	國塚 理恵
-----	-------

自薬局名

処方番号 かぜ薬4 -	品名 薬局 店 感冒剤12号A	Lot No. 090310(管理しやすい番号で)
調整年月日 平成 21 年 3 月 10 日	天候 晴	温度 12
		湿度 30%
成分	1日分量	分量
日本薬局方 アセトアミノフィン	0.36g	1.8g
日本薬局方 イテンザミド	0.9g	4.5g
日本薬局方 マレイン酸クロルフェニラミン	0.0075g	0.0375g
日本薬局方 dl-塩酸メチルエドリン散	0.6g	3g
日本薬局方 リン酸ジヒドロコデイン100倍散	2.4g	12g
賦形剤 日本薬局方 乳糖	1.7325g	8.6625g
原料の箱を参照		
見本		
全量	6.00g	30g
調整者	戸田 康紀	
製剤出来高分量	g	否
用法・用量	規格	1包 2 g、1日 3 包= 6 g
大人 1回 2 g 1日 3 回	分包年月日	平成 21 年3月 10日
	分包者	戸田 康紀
使用期限・その他特記事項 2011.3(製造後2年間で)	包装年月日	平成 21 年3月 10日
		5日分15包入 1 包装
		日分 包入 包装
		日分 包入 包装
製剤全量 90 g - 分包全量 90 g = 残量 0 g		
試験	平成 年 月 日	試験者
	確認	
	定性	
	重量偏差	
定量	判定	